

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 24-5-78435931  
BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 47.22.87 47.13.82  
Nouveaux numéros de téléphone : 09-06-43 et 09-27-46

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction  
Départementale de l'Agriculture  
à Châlons-sur-Marne

BULLETIN N° 129 - 23 mai 1978

GRANDE CULTURE

Abonnement annuel : 60 F

Charançon des siliques du colza : Les colzas d'hiver arrivent en fin de floraison dans la plupart des secteurs et les conditions climatiques restent défavorables à l'évolution du charançon des siliques, d'ailleurs relativement rare. Tout traitement est donc déconseillé.

Méligèthes sur colza de printemps : Une surveillance sérieuse s'imposera dès le prochain relèvement des températures sur toutes les cultures présentant des ébauches florales.

Intervenir dès que l'on remarque en moyenne 1 méligèthe par plante.

Il est rappelé que le colza de printemps, de par sa végétation très rapide et courte, ne peut, comme le colza d'hiver, compenser certains dommages par l'émission de nouveaux boutons.

Mildiou de la pomme de terre - Il est conseillé de réaliser une première intervention sur les variétés sensibles à la maladie :

- dans les cultures levées dès le début mai.
- dans les cultures levées ultérieurement mais dont la végétation a pu être noyée un certain temps.

## ETAT SANITAIRE DES CÉRÉALES

Ainsi que nous l'avons déjà signalé le Cnephasia (tordeuse des céréales) reste peu actif sur les diverses céréales, les conditions d'installation des chenilles ayant été défavorables.

Escourgeons et orges de printemps : D'importants dégâts de Rhynchosporiose sont localement observés sur cultures d'escourgeons non protégées (nos avis du 20 avril et du 3 mai). Il est maintenant trop tard pour envisager une intervention sauf pour les cultures en secteur très tardif et en cours d'épiaison. Par contre surveiller les orges de printemps, également sensibles à la maladie et qui doivent être protégées lorsque des taches fréquentes s'observent sur le feuillage.

Sur variété d'escourgeon Nymphe il est observé des attaques de Helminthosporiose. Dans les conditions actuelles une intervention ne peut être recommandée.

Blés d'hiver : Sur variétés Top et Rudi, il est parfois remarqué des décolorations et altérations foliaires, arrondies, disposées longitudinalement et pouvant être confondues avec des attaques de rouille jaune. Il s'agit en réalité de lésions consécutives à un trouble physiologique très vraisemblablement lié à un défaut dans l'alimentation.

Oïdium peu évolutif et parfois observé à la base des plantes.

Maladies de pied en évolution parfois sérieuse sur cultures non protégées.

Rouille brune observée localement, en sols limoneux, sur variétés Talent et Top. Aucune intervention ne se justifie dans les prochains jours.

Le Chef de la Circonscription  
Phytosanitaire Champagne,

J. DELATTRE.

7229